

Pescara 23 02 2013

- I colori della tubercolosi



Dott.

Alessandro

Credendino



**MISURE DI  
PROFILASSI E CONTROLLO  
IN AMBITO  
COMUNITARIO / TERRITORIALE**

NEI TEMPI MODERNI

LA PREVENZIONE DELLA TUBERCOLOSI NEL TERRITORIO

NON SI FA PIU' SISTEMATICAMENTE SU TUTTA LA POPOLAZIONE

MA SOLO SU PARTICOLARI GRUPPI A RISCHIO

**I SENZA FISSA DIMORA**

**E' OPPORTUNO CHE GLI HOMELESS**

**SIANO INVIATI**

**ANCHE DA STRUTTURE DI VOLONTARIATO**

**AD UN CONTROLLO PREVENTIVO**

# I TOSSICODIPENDENTI

QUANDO AFFERISCONO  
AL CENTRO DI RIFERIMENTO  
DEBONO ESSERE VALUTATI  
PREVENTIVAMENTE  
NEL CORSO DI RECUPERO  
PER IL RISCHIO  
DI CONTAGIO TUBERCOLARE

# I CARCERATI

VI SONO NORME PRECISE  
CHE PREVEDONO  
ALL'INGRESSO  
LO STUDIO DEL CONTAGIO

# STRANIERI

Per stranieri,intendo qui, cittadini non italiani,provenienti da paesi ad alta endemia di tubercolosi

# Cittadini stranieri affetti da tbc nella asl di pe

|                       |           |                  |
|-----------------------|-----------|------------------|
| romania               | ucraina   | senegal          |
| marocco               | macedonia | Sud est asiatico |
| Centro sud<br>america |           |                  |



# Portatori di malattie croniche

silicosi

hiv

DIABETE

# Soggetti in trattamento con farmaci “biologici”

Psoriasi

Artrite psoriasica

Artrite reumatoide

crohn

Soggetti trapiantati

Soggetti con neoplasie

# Personale di assistenza sanitaria

medici

Personale tecnico - infermieristico

Addetti ai servizi

badanti

# Contatti di casi bacilliferi

famiglia

scuola

Ambiente di lavoro

# Soggetti in età senile avanzata

- Soggetti che in giovane età hanno avuto una tubercolosi minimale, con autonoma guarigione, non trattata farmacologicamente, eventualmente con scarsi reliquati, possono, in tarda età, avere una riattivazione.

# COSA E' IL CONTROLLO PREVENTIVO ?

COUNSELING

VISITA

TST MANTOUX

RX TORACE


TERAPIA PREVENTIVA ISONIAZIDICA

# mantoux





# IGRA



# DUE PROBLEMATICHE



# DAL PUNTO DI VISTA ORGANIZZATIVO

CHI ?

DEVE FARE ?

CHE COSA ?

COME ?

# DAL PUNTO DI VISTA ORGANIZZATIVO

**CHI ?**

i. e. mi. p. t. m co. ass.san.

**DEVE FARE ?** s. t. ca. disp. funzionale

**CHE COSA ?** Inps. Altri serv. Terr. Inail

**COME ?** Tac. Tactb. Eco. Bal. Urbk. Ost.

# 1976



# 1976





# 1976



# 2012





# DAL PUNTO DI VISTA SCIENTIFICO

MANTOUX POSITIVA

IGRA POSITIVO

? PRESENZA DI MYCOBATTERI NELL'ORGANISMO ?

? SOLO MEMORIA IMMUNITARIA ?

# TERAPIA PREVENTIVA

FARMACO ---- ISONIAZIDE

DURATA ----- 6 MESI

**QUANDO ?**

**SICURAMENTE**

**ALL' ATTO DEL CONTAGIO**

# OSSERVAZIONE, PER ESEMPIO

- DAL 1980 HO FATTO IL TST A MIGLIAIAIA DI SOGGETTI PER IL LIBRETTO SANITARIO
- AI SOGGETTI CUTIPOSITIVI NON HO MAI SOMMINISTRATO LA TERAPIA ISONIAZIDICA
- NESSUNO DI QUESTI HA MAI SVILUPPATO LA TUBERCOLOSI IN SEGUITO

# F. D. nato il 1953

## IN ATTESA DI TRAPIANTO RENALE

|  | NOV. 2010                   |  |
|--|-----------------------------|--|
|  | MAG. 2011                   |  |
| MANTOUX<br>POSITIVO<br>10 mm           |                             | MANTOUX<br>POSITIVO<br>10 mm               |
| IGRA<br>ELISPOT TB<br>POSITIVO 9 SPOTS |                             | IGRA<br>QUANTIFERON<br>POSITIVO 0,70 IU/ml |
|  | TERAPIA<br><br>ISONIAZIDICA |  |